

Những loại thuốc trị lâu dài cho bệnh suyễn

Thuốc Corticosteroids để hít vào

- Có nhiều loại stê-roi khác nhau.
- Loại thuốc này không phải là loại người ta dùng để tập cho nở bắp thịt.
- Thuốc này rất công hiệu để trị chỗ sưng trong đường thở. Stê-roi hít vào sẽ gây ra vài ảnh hưởng phụ.
- Nên hỏi bác sĩ nếu quý vị lo lắng về những ảnh hưởng phụ này.
- Điều quan trọng là phải dùng thuốc này mỗi ngày.

Các tên thuốc bao gồm:

Flovent Azmacort Advair
Becloment Aerobid Pulmicort



Cromlyn Sodium/Nedocromil Sodium

- Cromolyn and Nedocromil, 2 thuốc này làm giảm sưng trong đường thở
- Những thứ thuốc này cần phải dùng cùng một lúc, ít nhất 3 lần một ngày mới có công hiệu, thường là 4 lần .

Các tên thuốc bao gồm:

Intal Tilade

Leukotriene Modifiers

- Thuốc này được làm thành viên .
- Quý vị uống thuốc này hàng ngày để làm giảm sưng trong đường thở bên trong phổi.

Các tên thuốc bao gồm:

Accolate Singulair Zflo



Beta agonists có công hiệu lâu dài:

- Những thứ thuốc này cũng giống như thuốc hạ suyễn nhanh nhưng có hiệu ứng chậm hơn và giữ công hiệu được lâu hơn.
- Không được dùng thuốc này lẻ loi. Chỉ được dùng chung với những thuốc có công dụng lâu dài.
- Chớ bao giờ dùng thuốc này khi cần hạ nhanh triệu chứng suyễn.

Các tên thuốc bao gồm:

Serevent Foradil Volmax

Thuốc uống Corticosteroids

- Thuốc uống Corticosteroids thường chỉ được dùng vài ngày sau khi bị cơn suyễn nặng.
- Thuốc được bào chế thành viên hoặc xi-rô.
- Những thứ thuốc này có thể gây ra ảnh hưởng phụ nếu dùng lâu dài.
- Những người bị suyễn nặng có thể dùng thuốc này mỗi ngày.

Các tên thuốc bao gồm:

Prelone Pediapred Decadron

